

Bident feuillé (Astéracées) *Bidens frondosa* L.



Plante herbacée annuelle,
pouvant atteindre 2 m de haut,
originaires d'Amérique du Nord.



© G. Huguault (MNHN-CBNBP)

Akène portant deux arêtes et
couvert sur les 3/4 inférieurs de
poils raides dirigés vers le haut

Inflorescences


Fleurs
en capitule, entourées de
bractées foliacées, portées par
un long pédoncule

Feuilles opposées, composées de 3
à 5 folioles, portées par un pétiole
non élargi et non ailé

Feuillage



© P. Vahrameev (MNHN-CBNBP)



Tige souvent
rougeâtre
dans sa partie
supérieure

Racines peu développées
Plante s'arrachant facilement

J F M A M J J A S O N D

Extrait de : Hudin S., Vahrameev P., et al. 2010. Guide d'identification des plantes exotiques envahissant les milieux aquatiques et les berges du bassin Loire-Bretagne, Fédération des Conservatoires d'espaces naturels, 45 p.

Dissémination zoochore.

Les graines
s'accrochent
aux pelages et
vêtements et
sont ainsi
transportées
par les animaux
ou les hommes.

Egalement
dissémination
des graines par
l'eau.

© R. Dupré (MNHN-CBNBP)



Habitats

Milieux riverains, généralement sur vases et gravières exondées : berges des canaux, des rivières et des plans d'eau.

Confusions possibles

> Avec le bident tripartite (*Bidens tripartita*) et le bident radié (*B. radiata*). Ces bidents autochtones ont des feuilles simples ou composées, portées par un pétiole épais à ailé et dont les folioles ne sont jamais pétiolées.



© P. Vahrameev (MNHN-CBNBP)

Bidens tripartita