

# Vigne vierge

(Vitacées)

*Parthenocissus inserta* (A. Kern.) Fritsch




Plante grimpante vivace, originaire d'Amérique du Nord.



Feuillage

Feuilles alternes, à 5 folioles dentées courtement pétiolées, d'un vert brillant et longues de 6 à 15 cm  
Feuillage caduc rougissant à l'automne



Baies de 3 à 7 mm devenant noir-bleuté à maturité, regroupées en grappes

Petites fleurs verdâtres très discrètes

Tige volubile, pouvant aussi courir sur le sol



Vrille

Vrilles opposées aux feuilles, ramifiées par 3 ou 5 et renflées aux extrémités mais ne formant pas de ventouses

Dispersion des fruits et des graines par les oiseaux.  
Capacité de bouturage de fragments de tiges.



## Habitats et variétés

Forêts alluviales, friches, pelouses sableuses et grèves des rivières, milieux rudéraux (décombres, haies, vieux murs).

## Confusions possibles

Plusieurs confusions sont possibles, pour lesquelles la clé de détermination ci-dessous est utile.

- Feuilles opposées rudes et râpeuses, découpées en 5 lobes : *Humulus lupulus*
- Feuilles alternes non divisées jusqu'à la base
  - Feuilles découpées pour la plupart en 5, lobes profonds : *Vitis vinifera*
  - Feuilles découpées en 3 lobes
    - vrilles terminées par des ventouses : *Parthenocissus tricuspidata*
    - vrilles sans ventouses : *Vitis riparia*
- Feuilles alternes, divisées jusqu'à la base, généralement 5 folioles pétiolées
  - Vrilles opposées aux feuilles, ramifiées par 3 ou 5, renflées aux extrémités mais ne formant pas de ventouses : *Parthenocissus inserta*
  - Vrilles à 5, 8 ramifications terminées par des ventouses : *Parthenocissus quinquefolia*



*Humulus lupulus*



*Parthenocissus quinquefolia*